

PRECONISATIONS - HELIKIT

Conditions pré-analytiques :

- Ne pas manger ni boire (jeûne + 12h)
- Ne pas fumer depuis la veille.
- Le test doit être réalisé après arrêt de tout traitement antibiotique depuis au moins 4 semaines,
- Arrêt des anti-sécrétoires depuis 2 semaines (IPP, anti-H2),
- Arrêt des pansements gastro-intestinaux depuis 24 heures.

Ne pas faire le test aux enfants < 3 ans.

Entre 3 et 11 ans, utiliser le Test INFAL.

Ne pas faire le test en cas de grossesse ou d'allaitement.

Anti-sécrétoires :

- IPP, Inhibiteurs de la pompe à proton :

Inexium, Lanzor, Ogast, Mopral, Omeprazole, Zoltum, Eupantol, Inipomp, Pariet

- Anti-H2 molécule :

Cimétidine, Ranitidine, Stomedine, Tagamet, Pepsidac, Pepdine, Nizaxid, Azantac, Raníplex, Pepsidduo, Cytotec, Keal, Ulcar

Pansements gastro-intestinaux

Digestif Marga, Gelusil, Isudrine, Maalox, Moxydar, Phosphalugel, Rennie, Riopan, Rogel
Xolaam, Actapulgate, Bedelix, Smecta, Bolinan, Poly-Karaya, Pepsane, Polysilane, Siligaz, Acidrine
Contracide, Gastropulgite, Gelox, Kaomuth, Mutésa, Neutroses

Matériel:

- **Kit apporté par le patient**