



 Cerbaliance	PRECONISATIONS PATIENT	Référence : DE-PRA-088 Version : 4 Date d'application : 17/01/2022 Page : 7 sur 23
--	-------------------------------	---

PRECONISATIONS – RECUEIL URINAIRE : ECU

Le recueil s'effectue de préférence sur les urines du matin (pas besoin d'être à jeun) et avant toute prise de traitement antibiotique. S'il doit, exceptionnellement, être réalisé dans la journée, faire le recueil loin d'une miction (au moins 3 heures).

Protocole

- EFFECTUER UN LAVAGE HYGIENIQUE DES MAINS
- EFFECTUER UNE TOILETTE INTIME AVEC UNE LINGETTE DESINFECTANTE OU DE L'EAU ET DU SAVON ,
- ELIMINER LE 1ER JET D'URINE DANS LES TOILETTES
- SI LE LABORATOIRE VOUS A REMIS UN FLACON AVEC UN BOUCHON BLEU OU JAUNE, NE PAS OTER LA LANGUETTE EN PAPIER FIXEE SUR LE BOUCHON
- URINER LE 2ème JET DANS LE FLACON STERILE (Ne l'ouvrir qu'au moment du recueil)
- REFERMER SOIGNEUSEMENT LE FLACON EN EVITANT DE TOUCHER LE BORD SUPERIEUR DU FLACON
- NOTER SUR L'ETIQUETTE VOS NOMS, PRENOMS ET HEURE DU RECUEIL
- REMPLIR LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS CLINIQUES



Rapporter le plus rapidement possible le flacon au laboratoire.

SI LE TEMPS DE TRANSPORT DEPASSE 2 HEURES,

METTRE IMPERATIVEMENT LES URINES AU REFRIGERATEUR.



1 Se laver les mains avec soin, puis effectuer une toilette intime selon le protocole.



2 Ouvrir le flacon et poser le canule vers le bas.

Attention : ne pas toucher le bouchon du flacon.

